

Röntgenfoto's



Bouriciuslaan 82
9203 PG Drachten
Tel.: 0512 - 57 10 30
Fax.: 0512 - 57 10 40
E-mail: info@bouriciuslaan.nl
Web: www.bouriciuslaan.nl



'Samen werken aan gezonde tanden'

‘Samen werken aan gezonde tanden’ is al vanaf de start van onze praktijk in 2000 onze leus. Ons team helpt u zorgen voor een gezond en functioneel gebit. Juist door onze samenwerking hebben we ons in verschillende tandheelkundige behandelingen kunnen specialiseren. Hierdoor kunt u bij Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk terecht voor tandheelkundige zorg van a tot z.

Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom informeren we u niet alleen persoonlijk maar ook via onze folders. In deze folder geven we informatie over röntgenfoto’s.

Waarom röntgenfoto’s?

Om uw gebit te onderzoeken gebruikt de tandarts een spiegel en een sonde (haakje). Maar daarmee kan alleen de buitenkant van de tanden, kiezen en tandvlees gecontroleerd worden. Om te kijken of er tussen de tanden en kiezen een gaatje zit zal er een röntgenfoto gemaakt moeten worden. Ook kan op een foto duidelijk worden dat er bijvoorbeeld een wortelpuntontsteking zit.

Bij kinderen worden foto’s gemaakt om te kijken of alle tanden en kiezen aanwezig zijn die moeten doorbreken. Als er een tand of kies moet worden getrokken, kan op de foto de ligging en de vorm van de tand of kies worden bekeken.

Is het schadelijk?

Het maken van een röntgenfoto is niet schadelijk. Er wordt slechts een zeer kleine hoeveelheid straling gebruikt. Hierdoor is de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid minimaal. Bovendien wordt in de Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk gebruik gemaakt van digitale röntgenfoto’s. Hierdoor is er veel minder straling nodig dan bij de ouderwetse systemen.

Om niet onnodig aan röntgenstraling bloot te staan gaat de tandarts of –assistente bij het maken van een foto soms achter een deur of schot staan. U ontvangt immers maar een enkele keer röntgenstraling, maar de tandarts of –assistente maakt veel vaker een foto.

Röntgenfoto’s en zwangerschap

Tijdens een controle worden vaak röntgenfoto’s gemaakt. Tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap is de vrucht extra kwetsbaar voor invloeden van buitenaf zoals röntgenstralen. Hoewel de straling niet op de ongeboren baby wordt gericht proberen we het maken van röntgenfoto’s tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap zoveel mogelijk te vermijden.