

praktijkuren vallen grotendeels onder schooltijd. Mocht dit problemen opleveren, geef dit dan aan bij de tandarts zodat een passende oplossing kan worden gezocht.

Mochten er verder nog vragen zijn, bel dan gerust met de praktijk. Om later eventuele misverstanden te voorkomen is het verstandig om deze folder goed te bewaren.

Een geheemelte stangetje of TPA



Bouriciuslaan 82
9203 PG Drachten

Tel.: 0512 - 57 10 30
Fax.: 0512 - 57 10 40
E-mail: info@bouriciuslaan.nl
Web: www.bouriciuslaan.nl

orth-07 13-04-2015

'Alle moderne tandheelkunde onder één dak'



Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk

Een gehemelte stangetje of TPA (Trans Palatal Arch) wordt gebruikt om de bovenkiezen te verankeren, de bovenkaak eventueel licht te verbreden of de bovenkiezen wat te draaien om extra ruimte te creëren.

De TPA bestaat uit twee metalen bandjes om de eerste grote kiezen in de bovenkaak, met daartussen een stevige metalen draad. Aan de gehemeltezijde van de bandjes zit een buisje. De gehemeltedraad wordt aan beide kanten in dit buisje vastgemaakt. De draad maakt een bocht met het gehemelte mee, maar raakt het niet.



Het plaatsen van een TPA

Een TPA wordt in twee afspraken geplaatst:

1. Separeren

Eerst moet er een kleine beetje ruimte worden gemaakt tussen de eerste grote kiezen in de bovenkaak. Dit gebeurt met kleine elastiekjes die tussen de kiezen worden gedrukt. Maximaal zijn dit twee elastiekjes per kies (aan de voor- en achterzijde). Het plaatsen van de elastiekjes duurt maar enkele minuten. De elastiekjes kunnen wat gevoeligheid veroorzaken aan de kiezen, omdat deze een klein beetje verschuiven.

2. Banderen + plaatsen

De volgende afspraak is enkele dagen later. De elastiekjes worden weer weggehaald en de bandjes kunnen gepast worden. Tijdens het passen moeten de bandjes met een bijstokje goed op de plaats worden gebeten. Als ze goed passen worden ze weer van de kiezen gehaald en kunnen ze worden vastgezet. Dit gebeurt met een speciaal soort 'cement'. Het cement wordt in de bandjes gesmeerd, en daarna worden de bandjes weer op de kiezen geschoven. Omdat ze al gepast zijn gaat dit veel sneller. Het cement wordt hard gemaakt met een blauwe lamp. Daarna worden de overtollige lijmrrestjes weggehaald. Het plaatsen van de bandjes kan door de orthodontie assistente of tandarts worden gedaan.

Direct hierna wordt de gehemeltedraad door de tandarts passend gemaakt en in de buisjes van de bandjes geschoven. Met elastiekjes worden ze daarna aan beide kanten extra vast gezet. De gehemeltedraad zit vast in de mond. Dat betekent dat de beugel niet zelf in of uit gedaan kan worden. Deze behandeling duurt bij elkaar ongeveer drie kwartier.

Het dragen van een TPA

De eerste dagen kunnen de kiezen (waar de bandjes om zitten) soms gevoelig zijn, dit hoort na een paar dagen weer weg te zijn. Ook lijkt het soms of de kiezen wat losser gaan staan, dit betekent dat de beugel werkt en de kiezen gaan schuiven.

Eten en drinken: Met een TPA kan normaal gegeten en gedronken worden. In het begin zal het doorslikken van eten soms iets moeilijker zijn omdat voedsel achter het stangetje kan blijven haken. Na enige tijd zal dit geen hinder meer geven.

Poetsen: Gewoon normaal poetsen, maar nu ook over het stangetje, en na afloop nog even extra over de bandjes om de grote kiezen borstelen.

Beugelcontroles

Om de beugelbehandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vindt er gemiddeld één keer per maand een controle plaats. Extra bezoeken per maand maken de beugelbehandeling niet duurder. Per maand komt er één nota, ongeacht het aantal bezoeken. Afspraken die zonder tijdig bericht (minimaal 24 uur voor de afspraak) niet zijn nagekomen kunnen (zonder verder overleg) in rekening worden gebracht.

Mocht een bandje los zitten (controleer dit regelmatig met de vingers), de beugel stuk zijn of niet meer goed zitten/ passen, bel dan altijd voor een afspraak tussen door om de reparatie zo snel mogelijk te laten plaats vinden. Ook al staat er binnen enkele dagen een controle afspraak, dan toch graag bellen, dan kunnen wij hier rekening mee houden en onnodige wachttijden voorkomen.

De duur van de behandeling is afhankelijk van vele factoren, zoals de groei en ontwikkeling van het gezicht, gebit en de medewerking van de patiënt. Derhalve kan dus niet met zekerheid worden voorspeld hoelang de behandeling gaat duren.

Helaas is het niet te voorkomen dat afspraken ook onder schooltijd worden gepland. Immers de meeste patiënten zijn schoolgaand en onze