

Instructies na een operatie in de mond



Bouriciuslaan 82
9203 PG Drachten
Tel.: 0512 - 57 10 30
Fax.: 0512 - 57 10 40
E-mail: info@bouriciuslaan.nl
Web: www.bouriciuslaan.nl

impl-02 16-06-2010

Alle moderne tandheelkunde onder één dak



‘Samen werken aan gezonde tanden’ is al vanaf de start van onze praktijk in 2000 onze leus. Ons team helpt u zorgen voor een gezond en functio-neel gebit. Juist door onze samenwerking hebben we ons in verschillende tandheelkundige behandelingen kunnen specialiseren. Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom informeren we u niet alleen persoonlijk maar ook via onze folders.

U bent in onze praktijk geweest voor een operatieve ingreep in uw mond. Misschien heeft u na deze operatie een aantal vragen? In deze folder geven we daar hopelijk antwoord op. Daarnaast is het na een operatie belangrijk om uw mond zo schoon mogelijk te houden. Dit voorkomt de kans op ontstekingen. Ook hierover geven we informatie en een aantal instructies.

Hoelang duurt de verdoving?

Bij een operatieve ingreep geven we een plaatselijke verdoving. De verdoving is twee tot drie uur werkzaam, maar soms ook wel enkele uren langer. Zolang de verdoving nog werkt moet u voorzichtig zijn met het drinken van warme drinken. U voelt immers niet of de drank te heet is! Ook moet u er op letten dat u niet op uw lip bijt zolang deze nog verdoofd is.

Pijn

Als de verdoving uitgewerkt is kunt u pijn krijgen. Hiervoor kunt u pijnstillers gebruiken of misschien heeft u een recept voor pijnstillers van ons meegekregen. Gebruik bij voorkeur geen aspirine! Aspirine maakt het bloed dunner waardoor de wond eerder kan gaan nabloeden. Als pijn na twee dagen heviger wordt in plaats van minder, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen.

Nabloeden

Het is normaal dat de wond de eerste uren na de operatie wat nabloedt. U heeft dan een beetje rood gekleurd speeksel. Het is niet verstandig om uw mond regelmatig grondig te spoelen. U spoelt dan namelijk het stonsel weg dat nodig is om de wond te dichten. Blijft de wond bloeden, dan kunt u dit stoppen door een uur op een opgevouwen gaasje of schoon doekje te bijten. Blijft de wond nog steeds bloeden? Belt u dan met onze praktijk of met de dienstdoende tandarts.

Zwelling

Het is heel normaal dat de wang of de lip gezwollen is, soms met een blauw-groene verkleuring. U kunt het zwellen tegengaan door de eerste uren na de ingreep de wang of kin te koelen met een plastic zakje met ijsblokjes. Door de zwelling kan het ook moeilijk zijn uw mond te openen. Meestal neemt de zwelling tussen de tweede en vijfde dag na de operatie af.

Goed schoonhouden!

Het is heel belangrijk dat u uw mond zo schoon mogelijk houdt! Poets regelmatig uw gebit met een tandenborstel en tandpasta. Het is niet voldoende alleen de mond te spoelen. Probeer ook zo normaal mogelijk te eten, u hoeft geen maaltijden over te slaan. Roken remt het genezingsproces.

Hechtingen

De wond is in de meeste gevallen gehecht met hechtmateriaal dat na drie tot tien dagen vanzelf oplost. Als we hechtmateriaal hebben gebruikt dat niet oplost, dan verwijderen we dit bij uw volgende afspraak.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Of verloopt de genezing anders dan u is verteld of u leest in deze folder? Neemt u dan gerust contact met ons op! Ook 's avonds en in het weekend is één van de tandartsen van de dienstdoende Kring Drachtster Tandartsen bereikbaar om uw probleem aan voor te leggen.